

# EXPOSÉ ANALYTIQUE

DES

## TRAVAUX PUBLIÉS

PAR LE

**Docteur A. VIGOT**

PROFESSEUR SUPPLÉANT A L'ÉCOLE DE MÉDECINE

CHEF DES TRAVAUX PHYSIOLOGIQUES A L'ÉCOLE DE MÉDECINE

DE CAEN



---

C A N D I D A T U R E

AU TITRE DE

PROFESSEUR DE PHYSIOLOGIE A L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE CAEN

---

M A R S 1 9 0 0



## TITRES

---

Docteur en Médecine.

Ancien Interne des Hôpitaux de Nantes (1880-1882).

Ancien Chef de Clinique à l'École de Médecine de Nantes (1882-1883).

Lauréat de l'École de Médecine de Nantes.

1<sup>er</sup> Prix de fin d'année (1881).

2<sup>e</sup> Prix de Clinique (1881).

1<sup>er</sup> Prix de Clinique (1882).

Ancien Chef de Clinique à l'École de Médecine de Caen (1884-1886).

Lauréat de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen (prix  
Lesauvage (1892).

Membre de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Vice-Président de la Société de Médecine (1900).

Professeur suppléant à l'École de Médecine (1892).

Chef des Travaux physiologiques à l'École de Médecine de Caen (1892).

---



# EXPOSÉ ANALYTIQUE

DES

## TRAVAUX PUBLIÉS

---

### I. — Des Nœuds du Cordon ombilical

(*Journal de Médecine de l'Ouest*, 1883, 1<sup>er</sup> trimestre)

Étude basée sur quatre observations de nœuds du cordon ombilical, réunies pendant notre internat à la Maternité de Nantes.

Dans ces cas les nœuds n'étaient point serrés et n'avaient pas entraîné de complications.

---

### II. — Des Polypes fibro-muqueux de la cavité naso-pharyngienne

(*Thèse de Paris*, 1883)

Étude des polypes fibro-muqueux de la cavité naso-pharyngienne inspirée par notre maître, M. le Dr Heurtaux, étude qui comporte leur étiologie, leur siège, leurs symptômes, leur anatomie pathologique, leur diagnostic et leur traitement.

Étiologie. — Les polypes *fibro-muqueux* se trouvent dans les deux sexes, de 15 à 25 ans, tandis que les polypes *muqueux* se trouvent dans

les deux sexes, mais surtout chez les adultes, et les polypes *fibreux* dans le sexe masculin, de 10 à 20 ans.

**Siège.** — Les polypes *fibro-muqueux* s'insèrent à l'orifice postérieur des fosses nasales, les *muqueux* sur les parois latérales des fosses nasales et les *fibreux* à la base du crâne.

**SYMPTOMES.** — Les polypes *fibro-muqueux* n'envoient pas de prolongements dans les sinus et le crâne, déforment seulement le voile du palais, ne provoquent que de légers troubles fonctionnels; les *muqueux* n'envoient pas de prolongements, ne déforment pas les os, provoquent simplement de la gêne de respiration; les *fibreux* envoient des prolongements dans les sinus et le crâne, déforment les os et amènent des troubles fonctionnels graves, surtout des hémorrhagies.

L'anatomie pathologique est également différente dans ces trois variétés de polypes.

Les *fibro-muqueux* sont légèrement durs, élastiques, de couleur variable, opaques; à la coupe, la racine est fibreuse; dans le corps de la tumeur le tissu fibreux se dissocie.

Les *muqueux* sont mous, grisâtres, demi-transparents et présentent à l'intérieur des aréoles muqueuses. Les *fibreux* sont durs, pas élastiques, rosés extérieurement, blanc nacré intérieurement, opaques et à la coupe uniformément durs et fibreux.

Le pronostic des *fibro-muqueux* est bénin comme celui des *muqueux*; tandis que celui des *fibreux* est très grave.

Les opérations dans les trois sont différentes.

### III. — PLUSIEURS OBSERVATIONS PUBLIÉES DANS DIVERS JOURNAUX

#### Observation de Polyurie

(*Semaine médicale*, 1883, n° 35)

#### Quelques mots sur une tête d'enfant

(*Année médicale de Caen*, 1884, n° 5)

### Rupture de l'Artère splénique

(*Union médicale*, 1881, n° 157)

### Vésicatoires iodés

(*Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques*, 1886, n° 6)

---

## IV. — Polypes fibro-muqueux

(*Année médicale de Caen* 1884, n° 5)

Relation d'une observation communiquée par M. le docteur Bourienne, qui ressemble trait pour trait aux observations réunies dans notre thèse.

---

## V. — Quelques mots sur les Épanchements pleurétiques

(*Gazette des Hôpitaux*, 1881)

Relation de plusieurs observations recueillies pendant notre internat et publiées avec l'autorisation de nos maîtres. Cette étude a pour but de montrer les difficultés du diagnostic des pleurésies et les erreurs occasionnées à ce sujet.

Relation de deux cas de pleurésie purulente, l'une s'ouvrant au devant de la trachée, l'autre venant d'une périostite alvéolo-dentaire consécutive à l'extraction d'une dent.

## VI. — Coexistence de la Scarlatine et de l'Erysipèle

(Gazette des Hôpitaux 1885, n° 438)

Dans cette observation, nous avons voulu montrer la coexistence de deux virus sur le même malade. M. le professeur Grancher venait de signaler une observation de coexistence de la rougeole et de la scarlatine. En ce moment, nous dirions la coexistence, l'association des deux microbes de la scarlatine et de l'érysipèle.

---

## VII. — Luxation des deux Ponces en arrière

(Année Médicale de Caen, 1888, 15 june)

La luxation d'un ponce n'est pas une rareté, mais celle des deux ponces présente une certaine originalité.

Dans le cas présent, la réduction a été facilement obtenue par le procédé de Farabeuf.

---

## VIII. — Tubercule sous-cutané douloureux

(Année Médicale de Caen, n° 3)

Notre maître, M. le docteur Malherbe, directeur de l'Ecole de médecine de Nantes, a démontré que les tumeurs, dites *tubercule sous-cutané douloureux*, sont des tumeurs constituées par des *fibres musculaires lisses* et leur a donné le nom de *myome lisse sous-cutané douloureux*.

Cette observation vient à l'appui de cette thèse.

---



**IX. — Œdème aigu de la Glotte. — Trachéotomie. — Guérison**

(*Année médicale, 1888, n° 4*)

Homme de 59 ans, pris subitement, après refroidissement, d'œdème sus-glottique. La trachéotomie pratiquée a amené la guérison.

---

**X. — Rupture traumatique de l'Urèthre. — Taille hypogastrique. — Cathétérisme rétrograde**

(*Société de Chirurgie, 1888*)

Homme de 33 ans. Rupture traumatique de l'urèthre dans une chute à califourchon sur un morceau de bois; rétention d'urine. Après plusieurs essais infructueux d'uréthrotomie externe, nous pratiquons la taille hypogastrique et le cathétérisme rétrograde. Guérison qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui (1900).

---

**XI. — Chancre syphilitique des Lèvres**

(*Année médicale de Caen, 1891, n° 4*)

Nous publions ces deux observations de chancres syphilitiques pour mettre en garde les praticiens contre les erreurs de diagnostic.

C'est ce qui est arrivé dans un cas où une jeune fille m'est envoyée pour être opérée de *cancer de la lèvre*, alors qu'il s'agissait d'un chancre syphilitique.

---

## **XII. — Coexistence de la Variole et de la Vaccine**

(*Année médicale de Caen, 1890.*)

Dans une épidémie de variole, nous vaccinons une jeune fille qui ne l'avait pas été.

Elle était déjà en incubation de la variole. Les deux affections ont évolué simultanément. Nous avons présenté à la Société de médecine des photographies montrant les deux éruptions vaccinale et variolique juxtaposées.

Comme conclusion, nous pensons que la variole et la vaccine sont deux maladies distinctes.

---

## **XIII. — Manuel opératoire de l'opération césarienne**

(*Opuscule de 136 pages. — ADELIS, 16, rue Froide, 1892.*)

Nous avons traité les indications de l'opération césarienne, le manuel opératoire lui-même et les suites de l'opération. Ce travail était publié pour faire revivre, remettre en honneur l'opération césarienne, délaissée pour l'embryotomie. La méthode antiseptique a largement contribué à faire revivre l'opération qui, raconte la chronique, a donné César aux Romains.

---

## **XIV. — Mémoire sur les Dégénérescences vasculaires sanguines**

(*Couronné par l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. PRIX LESAUVAZE, 1892.*)

---

### XV. — Le Cidre peut-il servir de milieu de culture au bacille d'Eberth et au colibacille ?

(Travail publié dans les mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, 1897.)

Ce mémoire est basé sur des expériences faites au laboratoire de physiologie de l'Ecole de médecine. Le premier, nous démontrons que le bacille de la fièvre typhoïde ne cultive pas dans le cidre qui vient d'être fabriqué. Le bacille d'Eberth en cultures intensives additionné au cidre est vite détruit. Nous trouvons la cause de cette destruction dans l'acidité et la fermentation du cidre. Ces expériences ont été reprises au laboratoire Pasteur, à Paris, et à l'Ecole de médecine de Rennes où elles ont confirmé nos assertions.

---

### XVI. — Anatomie de l'Internat. — Splanchnologie

(Un volume de 750 pages, publié chez ANGLAIS, rue Froide, 36.)

Dans ce volume, nous avons essayé de mettre au point les principales questions d'anatomie de l'Internat. La plupart des questions qui sont posées portent sur la splanchnologie. Aussi, nous avons pensé faire œuvre utile en groupant ces questions et en les traitant comme une question d'Internat.

---